

# **BENZODERMOL®**

## **BENCILO BENZOATO**

## **TIABENDAZOL**

## **NEOMICINA**

**VIA DE ADMINISTRACION: TÓPICA DÉRMICA**  
**ESCABIOSIS - PEDICULOSIS - MICOSIS**  
**PIODERMITIS - LARVA MIGRANS**

### **FÓRMULA**

Cada 100 mL de emulsión contiene:

Tiabendazol .....	5,000 g
Neomicina Sulfato .....	0,700 g
Bencilo Benzoato .....	20,00 g
Excipientes .....	c.s.

### **ACCIÓN TERAPÉUTICA:**

Benzodermol N reúne en su fórmula fármacos de comprobada acción antiescabiótica y antibacteriana. Las acciones de complemento del Bencilo Benzoato y Tiabendazol optimizan las posibilidades terapéuticas permitiendo una rápida curación. La inclusión del Sulfato de Neomicina, antibiótico de amplio espectro, activo contra bacterias Gram Positivas y Gram Negativas, Staphylococcus aureus e incluso cepas resistentes a otros antibióticos, Streptococcus pneumoniae, Pyogenes, Escherichia coli, Klebsiella, Haemophilus influenzae, Salmonella typhi, Shigella, Micobacterium tuberculosis, elimina problema de las infecciones dérmicas asociadas, generadas por el rascado habitual, debido al molesto prurito que acompaña a estas patologías.

### **INDICACIONES TERAPÉUTICAS:**

Indicado en infecciones por larva migrans, escabiosis, pediculosis, y dermatomitosi infectadas o no.

### **CONTRAINDICACIONES:**

Reacciones alérgicas a los componentes.

### **REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS SECUNDARIOS:**

Rash cutáneo, irritación de piel.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

No aplicar en zonas de piel sensibles. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene Metilparabeno y Propilparabeno.

**RESTRICCIÓN DE USO:**

No aplicar sobre heridas cutáneas.

**INTERACCIÓN CON MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS:**

No aplique otro medicamento en la misma zona, aunque al ser de aplicación tópica las interacciones con otros medicamentos son poco probables.

**POSOLOGÍA Y MODO DE USO:**

Aplicar la emulsión con un algodón friccionando suavemente hasta la absorción completa repetir la aplicación 2 a 3 veces en las mismas zonas. Este tratamiento deberá mantenerse por lo menos durante 5 días.

**RECOMENDACIÓN:**

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas - Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204 800

**PRESENTACIÓN:**

Frasco x 60 mL.

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

**VENTA BAJO RECETA**

Elaborado por: Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. – Acceso Norte.

Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos. Asunción – Paraguay.

Director Técnico: Jaime Cristóful - Reg. Prof. 2.719

SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/Avda. España – Asunción, Paraguay.

Director Técnico: Amilcar Sena – Reg. Prof. 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños