

CLINTEX®

CLINDAMICINA

ANTIBIOTICO VAGINAL

OVULOS DE GELATINA
VIA DE ADMINISTRACION: VAGINAL

FORMULA:

Cada óvulo de gelatina contiene:

Clindamicina Fosfato equivalente a Clindamicina Base.....100 mg
Excipientes.....C.S.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antibiótico vaginal. Su mecanismo de acción se ejerce mediante la inhibición de la síntesis proteica en bacterias sensibles, se une a las sub-unidades 50 S de los ribosomas bacterianos y evita la formación de las uniones peptídicas.

INDICACIONES:

Está indicada para el tratamiento de la vaginosis bacteriana denominada anteriormente como vaginitis por *Haemophylus*, vaginitis por *Gardnerella*, vaginitis no específica, vaginitis por *Corynebacterium* o vaginosis anaeróbica. Debe descartarse, previamente, la presencia de otros patógenos comúnmente asociados con vulvovaginitis, a saber: *Trichomonas vaginalis*, *Chlamydia trachomatis*, *N. gonorrhoeae*, *Candida albicans* y virus del Herpes simplex.

CONTRAINDICACIONES:

Contraindicada en pacientes con una historia de hipersensibilidad a clindamicina, neomicina o cualquiera de los componentes de la formulación. También está contraindicada en personas con historia de enteritis, colitis ulcerativa o una historia de colitis asociada con antibióticos.

Uso pediátrico: no se ha establecido la seguridad y efectividad en niñas.

REACCIONES ADVERSAS:

Pueden o no presentarse las siguientes reacciones adversas: Tracto genital: cervicitis/vaginitis sintomática, *Candida albicans*, *Trichomonas vaginalis*, irritación vulvar, secreción vaginal, desorden menstrual. Sistema nervioso central: cefalea, vértigo. Dermatológico: rash, dolor en el sitio de aplicación.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Si los síntomas no mejoran en unos días, o si empeoran, consulte con su médico. Es importante que visite al médico después de usar todo el medicamento para asegurar que la infección haya desaparecido.

Este medicamento puede causar que algunas personas tengan mareos.

Asegúrese de saber cómo reacciona a este medicamento antes de manejar, usar maquinaria o hacer cualquier otra cosa que pudiera ser peligrosa si está mareada. Los medicamentos vaginales usualmente se escapan de la vagina durante el tratamiento. Use una toalla femenina para impedir que el medicamento se le pase a la ropa. No use tampones ya que pueden absorber el medicamento. También se necesitan buenos hábitos de salud para ayudar a curar su infección completamente y para ayudar a asegurar que no vuelva. Use ropa interior de algodón (o ropa interior o medias con interior de algodón) en vez de ropa interior sintética (por ejemplo de nylon o de rayón). Use sólo ropa interior recién lavada todos los días. No tenga relaciones sexuales mientras esté usando este medicamento. El tener relaciones sexuales puede reducir la potencia del medicamento. No use productos anticonceptivos de látex (goma) tales como condones, diafragmas o tapas cervicales por 72 horas después de dejar el tratamiento con la clindamicina.

INTERACCIONES:

Aumenta el efecto de agentes de bloqueo neuromuscular. Existe antagonismo con eritromicina y cloranfenicol.

POSOLÓGIA:

Vía de administración: intravaginal. Dosificación: introducir 1 óvulo profundamente en la vagina al acostarse durante 7 días consecutivos en mujer embarazada. En mujeres no embarazadas, 1 óvulo al acostarse durante 3 noches consecutivas.

RECOMENDACIÓN:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas - Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204800

PRESENTACIÓN:

Caja x 7 óvulos de gelatina.

Venta Bajo Receta.

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.

Elaborado por SWISS PHARMA GROUP S.A.

Zapadores del Chaco y Lope de Vega - San Lorenzo, Paraguay

Director Técnico: Q.F. Myriam Cabriza de Paredes - Reg. N° 2837

Para Laboratorios Catedral - Scavone Hnos. S.A.

Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. - Acceso Norte.

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconellos.

Asunción - Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719

SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España.

Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885