DOMBROZIL®

BEZAFIBRATO 400 mg 400 A.S.

HIPOLIPEMIANTE

COMPRIMIDOS A.S.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

FORMULA:
Cada comprimido de acción sostenida contiene:
Bezafibrato.....400 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
El Bezafibrato posee acción hipolipemiante.
Pertenece al grupo de los fibratos, reduce los niveles plasmáticos de: lipoproteinas de baja densidad (LDL), de muy baja densidad (VLDL) y triglicéridos y aumenta los niveles de lipoproteinas de alta densidad (HDL) que son protectoras.

INDICACIONES:
Hiperlipoproteinemia primaria de tipo IIa, IIb, III, IV, V (clasificación de Fredrickson).
Hiperlipidemia secundaria que persiste a pesar del tratamiento de la enfermedad primaria (gota, diabetes, mellitus).

CONTRAINDICACIONES:
Afecciones hepáticas graves, cirrosis biliar primaria. Alteraciones de la función renal.
Embarazo y lactancia.

REACCIONES ADVERSAS:
Son poco frecuentes y por lo general, desaparecen a las pocas semanas sin interrumpir el tratamiento: molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, somnolencia, fatiga, cefalea, dolores y calambres musculares.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Antecedentes de colelitiasis. Al comienzo del tratamiento, realizar controles de lípidos plasmáticos cada 2 semanas.
El medicamento debe ser suspendido si se producen calambres o dolores musculares.
La asociación con estatinas puede aumentar el riesgo de miositis.

Laboratorios Catedral
SCAVONE HNOS. S.A.
Santa Ana c/ Av. España - Tel. 608-171

Este medicamento contiene Almidón, por lo que debe tenerse en cuenta en el tratamiento de los pacientes celiacos. Los pacientes con alergia al almidón no deben tomar este medicamento.
Este medicamento contiene Lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia a la lactosa del APP insuficiencia observada en ciertas poblaciones de laponia o mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

INTERACCIONES:
Puede potenciar los efectos y la toxicidad de la Fenitoína, de los hipoglucemiantes y anticoagulantes orales.
La asociación de Dombrozil con una estatina aumenta el riesgo de miositis leve y rabdomiólisis.

POSOLOGÍA:
Un comprimido vía oral por día, preferentemente después de las comidas y con abundante líquido.

RECOMENDACIÓN:
En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas - Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204800

PRESENTACIÓN:
Caja x 30 comprimidos de acción sostenida.

Conservar en sitio fresco y seco a temperatura inferior a 30° C.
Venta Bajo Receta
Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. - Acceso Norte.
Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos.
Asunción - Paraguay
Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719
SCAVONE HNOS. S.A.
Santa Ana N° 431 c/ Avda. España.
Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

2455417/03