

ESPASMOSAN[®]

PROPINOXATO COMPUESTO

CLONIXINATO DE LISINA

ANTIESPASMODICO - ANALGESICO
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
VIA DE ADMINISTRACION: ORAL
SOLUCION INYECTABLE
VIA DE ADMINISTRACION: I.M. - I.V.

FORMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Propinoxato Clorhidrato.....	10 mg
Clonixinato de Lisina.....	125 mg
Excipientes.....	c.s.

Cada ampolla A x 1 ml contiene:

Propinoxato Clorhidrato.....	15 mg
Excipientes.....	c.s.

Cada ampolla B x 2 ml contiene:

Clonixinato de Lisina.....	100 mg
Excipientes.....	c.s.

INDICACIONES TERAPEUTICAS:

Indicado en estados espasmódicos del tracto gastrointestinal, biliar o urogenital en los cuales predomina el componente doloroso.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida a los principios activos, glaucoma, miastenia gravis, retención urinaria, hipertrofia prostática, estenosis pilórica orgánica. Embarazo y lactancia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, prostatismo, retardo de la evacuación gástrica orgánica o funcional, reflujo gastroesofágico. En pacientes añosos o debilitados pueden ocasionar trastornos del SNC, atonía intestinal o retención urinaria. Embarazo, Pacientes con antecedentes de ataques asmáticos consecutivos a la ingestión de otros AINE.

Este medicamento contiene Almidón, por lo que debe tenerse en cuenta en el tratamiento de los pacientes celíacos. Los pacientes con alergia al almidón no deben tomar este medicamento.

Este medicamento contiene Lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia a la lactosa del APP insuficiencia observada en ciertas poblaciones de laponia o mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS COLATERALES:

Sequedad de boca, disuria, visión borrosa, constipación, taquicardia modificables mediante un ajuste posológico, náuseas, vómitos.

INTERACCIONES:

Los antihistamínicos, fenotiazinas, antidepressivos tricíclicos, quinidina, y procainamida potencian los efectos tóxicos de los anticolinérgicos. El empleo concomitante con analgésicos opioides puede inducir un incremento del riesgo de constipación severa. Aumenta la acción del litio y metotrexato. Aumenta el riesgo de sangrados con anticoagulantes y trombolíticos. Disminuye la acción de antihipertensivos.

POSOLOGIA:

Vía oral: 1 - 2 comprimidos recubiertos 3 - 5 veces al día.
Inyectable I.M. - I.V.: Una ampolla A + una ampolla B cada 6 - 8 horas.

RECOMENDACION:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204800

PRESENTACION:

Caja x 10 comprimidos recubiertos.
Caja x 1 ampolla A x 1 ml + 1 ampolla B x 2 ml
Venta Bajo Receta

Elaborado por

Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S. A. - Acceso Norte
Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos - Asunción - Paraguay
Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719
SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España - Asunción - Paraguay
Director Técnico: Q.F. Amílcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.



2434564/04

Laboratorios Catedral

SCAVONE HNOS. S.A.
Santa Ana c/ Av. España - Tel. 608-171