

FLEBOX[®]

DIOSMINA

COMPRESIDOS RECUBIERTOS
VIA DE ADMINISTRACION: ORAL
FLEBOTRÓPICO - ANTIHEMORROIDAL

FORMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Diosmina: 600 mg
Excipientes: C.S.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Flebotrópico - Antihemorroidal

INDICACIONES

Está indicado principalmente en las afecciones de la circulación venosa como: várices incipientes, úlceras varicosas, flebitis, tromboflebitis. Síntomas asociados como pesadez y dolor de los miembros inferiores. Calambres. Telangiectasias. Insuficiencia venosa por atonía de las paredes (dolor y tumefacción de los miembros). Hemorroides internas y externas. Equimosis y manifestaciones lesiones cutáneas causadas por la fragilidad capilar. Edemas de origen linfático o venoso.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a la Diosmina o a cualquier componente del producto. Embarazo. Lactancia.

EFFECTOS SECUNDARIOS Y ADVERSOS:

Ocasionalmente se han reportado vómitos, náuseas diarrea y molestias gastrointestinales (menos del 2%) en personas sensibles. También cefalea. Estos efectos desaparecen al discontinuar el tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Carece de acción carcinogénica, mutagénica y teratogénica a corto, mediano y largo plazo. Los estudios han evidenciado la buena tolerabilidad en ratas, no se produjeron anomalías histológicas o anatómicas, habiéndolas administrado, 180 veces la dosis para el humano, ni en primates con dosis 35 veces superiores a las del humano durante 26 semanas. Se aconseja suspender la lactancia mientras dure el tratamiento. Efectos teratogénicos en humanos. Por estudios realizados y por el buen coeficiente de seguridad puede utilizarse para tratar la insuficiencia venosa del embarazo, sin riesgo para la paciente y/o el producto.

Insuficiencia venosa:

La eficacia de este medicamento depende del cumplimiento de buenas medidas higiénico-dietéticas.

Evitar la exposición al sol, el calor excesivo, la permanencia de pie durante períodos prolongados, el exceso de peso. La marcha prolongada y el uso de medias elásticas de compresión adaptadas, favorecen la circulación venosa.

Crisis hemorroidal:

La administración de este producto no exime del tratamiento específico de otras enfermedades anales. El tratamiento debe ser de corta duración. Si los síntomas no ceden rápidamente, se recomienda efectuar un examen proctológico y reconsiderar el tratamiento.

Como los comprimidos contienen lactosa, este producto no debe ser utilizado por pacientes con galactosemia congénita, síndrome de mala absorción de la glucosa y la galactosa o déficit de lactasa.

Embarazo: No se han informado efectos teratogénicos en animales. No existen estudios controlados en mujeres embarazadas. Por tal motivo, Diosmina no debe ser utilizado durante el embarazo.

Lactancia: Se desconoce si la Diosmina se elimina en la leche materna. No debe emplearse Diosmina en mujeres que se encuentran en período de lactancia. De acuerdo a la importancia del medicamento para la madre, el médico debe decidir sobre la conveniencia de interrumpir la lactancia o el tratamiento.

Uso pediátrico: No existen estudios sobre la eficacia y seguridad de la Diosmina en niños. No está recomendado el uso de Diosmina en niños.

RESTRICCIONES DE USO: EMBARAZO, LACTANCIA.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

Adultos

- Insuficiencia venosa: 1 comprimido por día, antes del desayuno.
- Crisis hemorroidal: 2 a 3 comprimidos por día, con las comidas.

INTERACCIÓN CON MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

No debe administrarse simultáneamente con antiácidos o alimentos altamente alcalinos, ya que puede disminuir su absorción.

SOBREDOSIS (SIGNOS, SÍNTOMAS, CONDUCTA Y TRATAMIENTO):

Síntomas: No se conocen. Tratamiento: Luego de una correcta evaluación del cuadro se podrá intentar la eliminación de la dosis no absorbida mediante inducción del vómito, lavado gástrico o administración de carbón activado. Tratamiento sintomático y de soporte. No se conocen antídotos específicos. Se desconoce el efecto de la hemodiálisis sobre la Diosmina y sus metabolitos.

RECOMENDACIÓN:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas - Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204 800

PRESENTACIÓN:

FLEBOX: Caja x 30 comprimidos recubiertos

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Venta Bajo Receta.

Elaborado por

Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S. A. – Acceso Norte

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconellos - Asunción – Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719

SCAVONE HNOS. S.A. - PHARMETICA - División Farmacéutica

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España - Asunción – Paraguay

Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.