FORTOSAN®

HIDROXIDO FERRICO POLIMALTOSA HIERRO 50 mg / mL

ANTIANÉMICO
SOLUCIÓN GOTAS - SOLUCIÓN ORAL
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

FORMULA:
FORTOSAN SOLUCIÓN - GOTAS: Cada ml de solución sin azúcar contiene:
Complejo Hidróxido Férrico Polimaltosa equivalente a Hierro Elemental (+++).....50 mg
Excipientes.....c.s.

FORTOSAN SOLUCIÓN ORAL: Cada 5 ml de solución oral sin azúcar contiene:
Complejo Hidróxido Férrico Polimaltosa equivalente a Hierro Elemental (+++).....50 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Antianémico por deficiencia de hierro.

PROPIEDADES:
El complejo hidróxido férrico polimaltosa es una fuente de provisión de hierro elemental, que es un constituyente esencial del cuerpo, necesario para la formación de hemoglobina y en los procesos oxidativos de los tejidos vivos.

INDICACIONES:
Prevención y tratamiento de toda clase de deficiencias de hierro, particularmente anemia por deficiencia de hierro.

CONTRAINDICACIONES:
Conocida sobrecarga de hierro. Hipersensibilidad a alguno de los componentes de las formulaciones. Hemosiderosis y hemocromatosis. Ulcera gástrica activa. Transfusiones repetidas de sangre. Enteritis regional y colitis ulcerosa. Anemia no ferropénica. Síndrome de Ostler. Rendu-Weber. Poliartritis crónica. Asma bronquial. Primer trimestre de embarazo.

ADVERTENCIAS:
Pacientes gastrectomizados tienen una pobre absorción de hierro. Se debe tomar precaución cuando se prescribe preparaciones con hierro a individuos con historia de úlcera gástrica. La duración del tratamiento no debe exceder los 3 meses después de la corrección de la anemia. No debe descartarse la coexistencia de déficit de vitamina B12 y/o de ácido fólico ya que la deficiencia combinada con hierro produce anemia microcítica. Pacientes que sufren sobrecarga de hierro son particularmente susceptibles a las infecciones. Pacientes con asma bronquial, con baja capacidad de fijar el hierro y/o deficientes de ácido fólico son susceptibles de tener reacciones alérgicas o anafilactoideas.

Laboratorios Catedral

SCAVONE HNOS. S.A.
Santa Ana c/ Av. España - Tel. 608-171

PRECAUCIONES:
Se recomienda, en todos los casos, comenzar con las dosis inferiores y posteriormente incrementar las mismas.
Embarazo: No administrar durante el primer trimestre del embarazo. Durante el segundo y el tercer trimestre sólo se administrará por indicación médica.
Lactancia: El hierro se excreta por la leche materna pero en concentraciones muy pequeñas que no son clínicamente significativas (alrededor de 0,5 mg/día).
Uso en Pediatría: Las diferentes formas farmacéuticas son apropiadas para su uso en niños.
Uso en Geriatría: Se utilizan las mismas dosis que para los adultos.

INTERACCIONES:
Los preparados con hierro interfieren en la absorción de las tetraciclinas y viceversa. Los preparados con hierro interfieren en la absorción del zinc y viceversa.
La absorción del hierro es alterada por el trisilicato de magnesio, antiácidos, neomicina, colestiramina, té, huevos o leche.
La absorción de la penicilamina, levodopa, bifosfonatos, ciprofloxacina, norfloxacina y ofloxacina es reducida por el hierro. El cloranfenicol retarda el clearance plasmático del hierro y su incorporación en los glóbulos rojos interfiriendo con la eritropoyesis.

REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS COLATERALES:
Anorexia, nausea, vómitos, trastornos gastro-intestinales, constipación, diarrea, deposiciones oscuras y reacciones alérgicas. Estos efectos adversos pueden minimizarse administrando las dosis después de las comidas. Particularmente anemia por deficiencia de hierro.

POSOLOGÍA:
Vía de administración oral. Solución Oral: adultos y niños mayores de 12 años: 2 cucharaditas (10 ml) 1 – 2 veces por día durante o después de las comidas. Dosis profilácticas: 5 ml por día (50 mg de hierro elemental). Niños de 6 a 12 años: 1 cucharadita (5 ml) 1 – 2 veces por día (50 a 100 mg de hierro elemental por día) durante o después de las comidas. De 2 a 5 años: 5 ml de solución oral por día en dosis divididas (50 mg de hierro elemental por día) Pacientes ancianos: la dosis normal del adulto es apropiada. Embarazo (durante el segundo y tercer trimestre) 2 cucharaditas de solución oral por día (100 mg de hierro elemental por día).
Gotas: 20 gotas 1-2 veces por día (50 a 100 mg de hierro elemental por día).
Infantes: comenzar con 6 gotas por día y aumentar a 20 gotas por día en dosis divididas.

RECOMENDACIÓN:
En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas
Av. Gral Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204 800

PRESENTACIÓN:
FORTOSAN SOLUCIÓN - GOTAS : Frasco x 30 ml
FORTOSAN SOLUCIÓN ORAL: Frasco x 120 ml

Venta Bajo Receta.
Elaborado por
Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. - Acceso Norte.
Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos.
Asunción - Paraguay
Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719
SCAVONE HNOS. S.A.
Santa Ana N° 431 c/ Avda. España.
Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885
Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.
Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).
Conservar en lugar seco.

2456939/04