

DICLOFENAC SODICO - PRIDINOL MESILATO PIRIDOXINA - VITAMINA B12

ANALGESICO - ANTIINFLAMATORIO MIORRELAJANTE - ANTINEURITICO

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS VIA DE ADMINISTRACION: ORAL

FORMULA:

Diclofenac Sódico	
Pridinol Mesilato	mg
Piridoxina HCl	ma
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	

ACCION TERAPEUTICA:

Analgésico, antiinflamatorio, antineurítico.

INDICACIONES:

Procesos inflamatorios dolorosos con componente miocontracturante. Afecciones reumáticas articulares y extraarticulares, Fibrositis, Mialgias, Lumbalgias, Ciatalgias, Tortícolis, Traumatismos, Esquinces.

CONTRAINDICACIONES:

Embarazo, lactancia, úlcera gastroduodenal activa, insuficiencia cardíaca descompensada, hipertensión arterial grave, infecciones bacterianas (a menos que la administración del

medicamento se acompañe de antibiótico o quimióterapia adecuados), virosis, micosis agudas, osteoporosis.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Debe controlarse la administración de NEURO DICLOFEN en pacientes afectados de trastornos hematopoyéticos, de la coagulación o de enfermedades gastrointestinales o cardiovasculares.

El medicamento se administrará con precaución en aquellos pacientes que presenten antecedentes ulcerosos o trastornos de la coaquilación.

Si se llevan a cabo cursos terapéuticos prolongados es aconsejable el control frecuente de las funciones hepática y sanguínea.

Los pacientes deben ser advertidos de no consumir alcohol durante el tratamiento.

No usar este medicamento en niños menores de 12 años de edad.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

NEURO DICLOFEN es habitualmente bien tolerado. En personas hipersensibles se han observado molestias gastrointestinales (náuseas, epigastralgia, diarrea), que habitualmente remiten al espaciar la administración del medicamento.

Con carácter excepcional se ha informado la aparición de exantema, edema periférico y moderada elevación de las transaminasas

INTERACCIONES:

De la misma manera que otros AINEs, el diclofenac puede incrementar la actividad de los anticoagulantes orales y elevar los niveles plasmáticos de litio y la digoxina. Asimismo, puede alterar la respuesta a los agentes antihipertensivos, diuréticos e hipoglucemiantes y acrecentar la posibilidad de manifestaciones tóxicas en pacientes bajo tratamiento con metotrexato y ciclosporina.

POSOLOGIAY FORMA DE ADMINISTRACION:

La dosis se adaptará al criterio médico y al cuadro clínico del paciente. Como posología media de orientación, se aconseja:

1 a 3 comprimidos recubiertos por día, administrados preferentemente después de las comidas.

SOBREDOSIS:

Si la misma se ingiere en forma accidental, los síntomas de sobredosis de la mayor parte de los AINE no se han descrito de forma completa. Los síntomas descritos generalmente han reflejado la toxicidad hepática, renal y para el SNC de los medicamentos.

El tratamiento que se recomienda incluye:

Vigilancia y mantenimiento de las funciones vitales, en caso de que se necesite respiración asistida no se deben utilizar estimulantes respiratorios.

La administración de antiácidos u otros alcalinizantes urinarios puede aumentar la excreción y aliviar los efectos gastrointestinales adversos.

Instauración de tratamiento sintomático y otras medidas de mantenimiento si es necesario.

Administración según necesidades expansores del volumen plasmático para la hipotensión.

Vaciado del estomago mediante inducción de la émesis (solo en pacientes consiente) o lavado gástrico. Los componentes del complejo B difícilmente podrán presentar cuadros de sobredosis en personas con función renal normal. El síntoma principal se refiere a la posibilidad de las reacciones del tipo anafiláctico

RECOMENDACION:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas - Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204800

PRESENTACION:

Caja x 20 comprimidos recubiertos.

Venta Baio Receta

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Flaborado por

Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. - Acceso Norte.

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos.

Asunción - Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. Nº 2.719

SCAVONE HNOS S A

Santa Ana Nº 431 c/ Avda. España.

Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. Nº 4.885

SCAVONE HNOS, S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España

Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena. Reg. Prof. Nº 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.