

NOCAND[®]

MICONAZOL

ANTIMICOTICO DE AMPLIO ESPECTRO

ÓVULOS

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: VAGINAL

POLVO - CREMA

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICA - DÉRMICA

FORMULA:

NOCAND N.F. OVULOS: Cada óvulo de gelatina contiene:

Miconazol Nitrato.....	200 mg
Excipientes.....	c.s.

NOCAND POLVO: Cada 100 g contiene:

Miconazol Nitrato.....	2 g
Excipientes.....	c.s.

NOCAND CREMA: Cada 100 g contiene:

Miconazol Nitrato.....	2 g
Excipientes.....	c.s.

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:

NOCAND es de amplio espectro en las dermatomycosis porque actúa en: dermatofitos, hongos parásitos de la piel, cabellos y uñas. Levaduras y hongos levúridos, huéspedes de la piel y mucosas (moniliasis). Bacterias Gram Positivas.

Clínicamente se ha observado que en las micosis cutáneas con cierta frecuencia se asocian diferentes tipos de hongos y se complican asiduamente con infecciones bacterianas, por ello adquiere fundamental importancia la ausencia de efectos secundarios de NOCAND, ya que debe aplicarse directamente sobre la zona afectada y los tratamientos en general son prolongados.

INDICACIONES:

En Ginecología: Candidiasis vaginal con o sin infección microbiana sobreagregada.

Dermatomycosis: infecciones de la piel y uñas. Tiña del cuerpo, mano y barba. Micosis de los pies y de las manos.

Onicomycosis. Micosis inguinales. Erosiones interdigitales, región axilar, pliegues interglúteos, región mamaria o del cuello. Pityriasis versicolor.

Micosis diversas. Infecciones por bacterias Gram Positivas.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en aquellos pacientes que han mostrado hipersensibilidad al miconazol.

REACCIONES ADVERSAS:

Efectos Colaterales: Han sido reportados casos aislados de irritación o sensación de ardor, después de su aplicación. En personas hipersensibles puede aparecer dermatitis por contacto.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

En caso de desarrollarse irritación o sensibilización se debe discontinuar el tratamiento e instituirse medidas adecuadas.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Ovulos: Por la noche al acostarse introducir profundamente 1 óvulo en la vagina. No levantarse hasta después de media hora. A la mañana siguiente, higienizarse normalmente.

El tratamiento debe durar por lo menos 10 días, aunque hubiesen desaparecido los síntomas.

Polvo y Crema: Aplicar NOCAND Crema hasta cubrir la lesión y frotar con el dedo hasta lograr la penetración de la misma. Este tratamiento deberá seguirse en forma ininterrumpida hasta la desaparición total de las lesiones (frecuentemente de dos a seis semanas).

Continuar luego por diez días más para prevenir recidivas. En las infecciones ungueales, cortar las uñas al ras. Aplicar sobre las zonas afectadas una o dos veces por día, frotando hasta que penetre. Luego cubrir con un vendaje oclusivo. Este tratamiento se hará diariamente hasta que caiga la uña y luego continuar hasta la desaparición total de la lesión.

NOCAND Polvo se emplea para lesiones húmedas, se aconseja usarlo combinándolo con la Crema.

SOBREDOSIS (Signos, Síntomas, Conducta y Tratamiento):

En caso de sobredosis o ingesta accidental; sin embargo, en caso de ingesta masiva se procederá a realizar lavado gástrico y manejo sintomático.

RECOMENDACIÓN:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas Av. Gral Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204 800

PRESENTACIÓN:

NOCAND POLVO: Talquera x 30 g

NOCAND CREMA: Tubo x 15 y 20 g

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Venta Bajo Receta.

Elaborado por: Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. Acceso Norte.

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos. - Asunción - Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719

SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España - Asunción - Paraguay

Director Técnico: Q.F. Amílcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

NOCAND N.F. OVULOS: Caja x 10 Óvulos

Elaborado por SWISS PHARMA GROUP S.A.

Zapadores del Chaco y Lope de Vega - San Lorenzo, Paraguay

Director Técnico: Q.F. Myriam Cabriza de Paredes - Reg. N° 2837

SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España - Asunción - Paraguay

Director Técnico: Q.F. Amílcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Venta Bajo Receta.

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.