REUMA DICLOFEN®

DICLOFENAC SODICO - PRIDINOL MESILATO
DEXAMETASONA - VITAMINA B12

ANTIRREUMATICO - ANTIINFLAMATORIO
MIORRELAJANTE

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

FORMULA:
Cada comprimido recubierto contiene:

Diclofenac Sódico	50 mg
Pridinol Mesilato	4 mg
Dexametasona	1 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	2,5 mg
Excipientes	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Antirreumático, antiinflamatorio, miorrelajante.

INDICACIONES:
Procesos inflamatorios dolorosos con componente miocontracturante. Afecciones reumáticas articulares y extra-articulares. Fibrositis. Mialgias. Lumbalgias. Ciatalgias. Tortícolis. Traumatismos. Esguinces.

CONTRAINDICACIONES:
Embarazo, lactancia, úlcera gastroduodenal activa, insuficiencia cardíaca descompensada, hipertensión arterial grave, infecciones bacterianas (a menos que la administración del medicamento se acompañe de antibiótico o quimioterapia adecuados), virosis, micosis agudas, osteoporosis.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Debe controlarse la administración de REUMA DICLOFEN en pacientes afectados de trastornos hematopoyéticos, de la coagulación o de enfermedades gastrointestinales o cardiovasculares.
Por su contenido en Dexametasona pueden aparecer manifestaciones de diabetes latente o agravar la evolución de la diabetes ya diagnosticada, obligando a incrementar la dosis de insulina.
Cuando se realicen tratamientos prolongados pueden aparecer manifestaciones de hipercorticismo, debiendo evitarse la supresión brusca del medicamento para eludir la aparición de síntomas de insuficiencia suprarrenal. Sin embargo, la posibilidad de aparición de estos efectos es mínima, si se siguen las pautas de tratamiento habituales en los estados alérgicos.
El medicamento se administrará con precaución en aquellos pacientes que presenten antecedentes ulcerosos o trastornos de la coagulación.
Si se llevan a cabo cursos terapéuticos prolongados es aconsejable el control frecuente de las funciones hepática y sanguínea.

Laboratorios Catedral
SCAVONE HNOS. S.A.
Santa Ana c/ Av. España - Tel. 608-171

Los pacientes deben ser advertidos de no consumir alcohol durante el tratamiento .
No usar este medicamento en niños menores de 12 años de edad.
Este medicamento contiene Lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia a la lactosa del APP insuficiencia observada en ciertas poblaciones de laponia o mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS:
REUMA DICLOFEN es habitualmente bien tolerado. En personas hipersensibles se han observado molestias gastrointestinales (náuseas, epigastralgia, diarrea), que habitualmente remiten al espaciar la administración del medicamento.
Con carácter excepcional se ha informado la aparición de exantema, edema periférico y moderada elevación de las transaminasas.

INTERACCIONES:
De la misma manera que otros AINEs, el diclofenac puede incrementar la actividad de los anticoagulantes orales y elevar los niveles plasmáticos de litio y la digoxina. Asimismo, puede alterar la respuesta a los agentes antihipertensivos, diuréticos e hipoglucemiantes y acrecentar la posibilidad de manifestaciones tóxicas en pacientes bajo tratamiento con metotrexato y ciclosporina.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
La dosis se adaptará al criterio médico y al cuadro clínico del paciente.
Como posología media de orientación, se aconseja: vía oral, 1 a 3 comprimidos recubiertos por día, administrados preferentemente después de las comidas.

SOBREDOSIS:
Los síntomas de sobredosis de la mayor parte de los AINE no se han descrito de forma completa. Los síntomas descritos generalmente han reflejado la toxicidad hepática, renal y para el SNC de los medicamentos.
El tratamiento que se recomienda incluye: Vigilancia y mantenimiento de las funciones vitales, en caso de que se necesite respiración asistida no se deben utilizar estimulantes respiratorios.
La administración de antiácidos u otros alcalinizantes urinarios puede aumentar la excreción y aliviar los efectos gastrointestinales adversos. Instauración de tratamiento sintomático y otras medidas de mantenimiento si es necesario. Administración según necesidades expansores del volumen plasmático para la hipotensión. Vaciado del estomago mediante inducción de la émesis (solo en pacientes consiente) o lavado gástrico.

RECOMENDACIÓN:
En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas - Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204800

PRESENTACIÓN:
Caja x 20 comprimidos recubiertos.

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.
Venta Bajo Receta
Elaborado por
Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S. A. – Acceso Norte
Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos - Asunción – Paraguay
Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719
SCAVONE HNOS. S.A.
Santa Ana N° 431 c/ Avda. España - Asunción – Paraguay
Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885
Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.

2456095/04