

TIXA[®]

AMOXICILINA SULBACTAM IBL

ANTIBIÓTICO BETALECTÁMICO - BACTERICIDA ASOCIADO
CON UN INHIBIDOR DE BETALECTAMASAS.

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
SUSPENSIÓN EXTEMPORÁNEA
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

FORMULA:

TIXA IBL 500: Cada comprimido recubierto contiene:

Amoxicilina Trihidrato equiv. a Amoxicilina Base.....	250 mg
Sulbactam Pivoxil equiv. a Sulbactam Base.....	250 mg
Excipientes.....	c.s.

TIXA IBL 1g.: Cada comprimido recubierto contiene:

Amoxicilina Trihidrato equiv. a Amoxicilina Base.....	500 mg
Sulbactam Pivoxil equiv. a Sulbactam Base.....	500 mg
Excipientes.....	c.s.

TIXA IBL DUO: Cada comprimido recubierto contiene:

Amoxicilina Trihidrato equiv. a Amoxicilina Base.....	875 mg
Sulbactam Pivoxil equiv. a Sulbactam Base.....	125 mg
Excipientes.....	c.s.

TIXA IBL 500: Cada 5 ml de suspensión extemporánea reconstituida contiene:

Amoxicilina Trihidrato equiv. a Amoxicilina Base.....	250 mg
Sulbactam Pivoxil equiv. a Sulbactam Base.....	250 mg
Excipientes.....	c.s.

TIXA IBL DUO: Cada 5 ml de suspensión extemporánea reconstituida contiene:

Amoxicilina Trihidrato equiv. a Amoxicilina Base.....	1.000 mg
Sulbactam Pivoxil equiv. a Sulbactam Base.....	250 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antibiótico betalactámico, bactericida asociado con un inhibidor de betalactamasas.

INDICACIONES:

Indicado en las infecciones de las vías respiratorias vías bajas: bronquitis, neumonía vías altas, faringitis, sinusitis, otitis media, infecciones de la piel y sus anexos, vías biliares y abdominales y de las vías urinarias, causadas por microorganismos sensibles a la amoxicilina y a gérmenes productores de betalactamasas, infecciones ginecológicas.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la penicilina o a derivados cefalosporínicos. Esta combinación no se debe utilizar en pacientes con mononucleosis infecciosa (infección causada por lo general, por el virus Epstein-Barr), porque desarrollan exantema durante el tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No se recomienda el uso del producto durante el embarazo y la lactancia, excepto bajo circunstancias especiales, esta medicación no debe ser usada cuando existen los siguientes síntomas: Alergia a la penicilina o a inhibidores de las lactamasas. Se debe considerar el riesgo beneficio cuando se presentan los siguientes problemas: Alergias en general, historias de asma, eczemas, hinchazón alrededor de la cara, disminución severa de la presión de sangre, salpullido superficial, dolor en las articulaciones. Colitis ulcerosas, enteritis regional y colitis asociadas a antibióticos.

REACCIONES ADVERSAS:

En algunos pacientes pueden llegar a presentarse manifestaciones digestivas; erupciones cutáneas, manifestaciones alérgicas, urticaria, eosinofilia, leucopenia, neutropenia, disfunción plaquetaria. Dolor de cabeza, candidiasis oral, candidiasis vaginal.

INTERACCIONES:

El uso simultáneo con un aminoglucosido causa efecto bactericida sinérgico contra algunas cepas de enterococos del grupo beta. El uso concomitante con allopurinol parece aumentar la frecuencia de exantema cutáneo por ambos fármacos. El probenecid bloquea la excreción tubular de la amoxicilina, elevando las concentraciones séricas. Las grandes dosis de penicilinas pueden interferir con la excreción tubular renal del metotrexato, retardando por tanto su eliminación y prolongando las concentraciones séricas del metotrexato. Anticonceptivos con estrógenos y progestágenos

POSOLÓGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía Oral.

Comprimidos recubiertos: en adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido recubierto cada 8 horas.

Suspensión Extemporánea: en adultos 250 mg cada 8 horas, en pediatría 40 – 50 mg / kg / día, fraccionada cada 8 o 12 horas.

SOBREDOSIS:

El tratamiento de los síntomas clínicos de sobredosis que incluyen sensibilidad neuromuscular o convulsiones, después de la ingestión reciente, consiste en vaciamiento del estómago por inducción de la emesis o lavaje gástrico, enseguida administrar carbón activado para reducir la absorción.

RECOMENDACIÓN:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204800

PRESENTACIÓN:

TIXA IBL 500: Caja x 7 y 14 comprimidos recubiertos.

TIXA IBL 1 g.: Caja x 7 y 14 comprimidos recubiertos.

TIXA IBL DUO: Caja x 7 y 14 comprimidos recubiertos.

TIXA IBL 500: Frasco con polvo para reconstituir 60 ml de suspensión extemporánea.

TIXA IBL DUO: Frasco con polvo para reconstituir 90 ml de suspensión extemporánea.

Venta Bajo Receta Simple Archivada

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Elaborado por

Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. - Acceso Norte.

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos.

Asunción - Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719

SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España.

Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.