TRIMSUL® BALSAMICO

TRIMETOPRIM
SULFAMETOXAZOL
AMBROXOL

ANTIBACTERIANO DE AMPLIO ESPECTRO
MUCOLITICO

COMPRIMIDOS - SUSPENSIÓN
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

FORMULA:
Cada comprimido contiene:
Trimetoprim..... 80 mg
Sulfametoxazol.....400 mg
Ambroxol Clorhidrato.....10 mg
Excipientes.....c.s.

Cada 5 ml de suspensión contiene:
Trimetoprim..... 40 mg
Sulfametoxazol.....200 mg
Ambroxol Clorhidrato.....5 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPEUTICA:
En las infecciones bacterianas del tracto respiratorio. Las exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica. Neumopatías agudas como: neumonía, bronconeumonía, absceso pulmonar, en todos los casos producidos por bacilos gramnegativos como Haemophillus influenzae sobre todo, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus. Profiláctico de las exacerbaciones agudas en bronquitis crónicas graves durante el invierno. Traqueobronquitis y empiemas. Infecciones de las vías respiratorias altas donde el germen es sensible.

INDICACIONES:
Infecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias provocadas por microorganismos Gram-positivos y Gram-negativos tales como: Pansinusitis, Faringitis, Amigdalitis, Laringitis, Traqueobronquitis, complicaciones bacterianas de la gripe, Bronquitis crónica, Bronquiectasia, Neumonías, Abscesos de pulmón.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a algunos de los componentes del medicamento; uremia; glomerulonefritis; citopenias hemáticas; hepatitis; embarazo y lactancia; prematuros y recién nacidos (< 6 meses); no administrar concomitantemente con: diuréticos tiazídicos, furosemida o anticonvulsivos, ya que se informa una elevada incidencia de trombocitopenia y megaloblastosis; gastritis o úlcera péptica.

Laboratorios Catedral
SCAVONE HNOS. S.A.
Santa Ana c/ Av. España - Tel. 608-171

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES:
Náuseas, vómito, glositis y estomatitis; alteración permanente de la función renal después del uso de trimetoprima/sulfametoxazol en pacientes con nefropatía, habiéndose notado una disminución reversible en el Clcr en los individuos con función renal normal; cefalea, depresión y alucinaciones; púrpura; Megaloblastosis, leucopenia o trombocitopenia, la dermatitis exfoliativa, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica (síndrome de Lyell) son raros y ocurren principalmente en ancianos.

SOBREDOSIS:
Si se exceden las dosis recomendadas, puede presentarse náusea, vómito, diarrea, somnolencia, erupción cutánea y dolor abdominal; el manejo incluye inducción de la emesis y puede valorarse un lavado gástrico, así como medidas generales de apoyo, ventilación adecuada y medicamentos de base que se utilizan en urgencias.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Si el paciente en tratamiento presenta señales de alergia, debe suspenderse el medicamento lo antes posible; los pacientes con historia de alergias o de asma bronquial que usen trimetoprima/sulfametoxazol (cotrimoxazol) deberán de ser vigilados estrechamente; los pacientes ancianos o con disfunción hepática o renal son más susceptibles de presentar reacciones alérgicas con el uso de cotrimoxazol.
Una forma de disminuir el riesgo de reacción adversa es utilizar el cotrimoxazol en lapsos cortos pero suficientes para erradicar a los agentes patógenos; como con cualquier tratamiento con sulfonamidas, los pacientes con porfiria o disfunción tiroidea deberán tener vigilancia estrecha.
Precaución en pacientes con disfunción hepática.
No administrar si Clcr <15 ml/min. Precaución en pacientes con disfunción renal (reducir dosis).
- Embarazo: Contraindicado. Sólo en casos de extrema necesidad para la madre.
- Lactancia: Tanto la trimetoprima como el sulfametoxazol se excretan por la leche materna. Por tal motivo, en un tratamiento indispensable para la madre que amamanta, deberá considerarse el riesgo de kernicterus en el recién nacido.

POSOLOGÍA:
Niños hasta 12 años: vía oral, 1 cucharadita cada 12 horas.
Adultos: vía oral, 2 comprimidos cada 12 horas.
Preferentemente luego de las comidas.

RESTRICCIONES DE USO:
Embarazo – lactancia.

RECOMENDACIÓN:
En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas - Av. Gral Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204 800

PRESENTACIÓN:
Trimsul Balsamico comprimidos: Caja x 20 comprimidos.
Trimsul Balsamico suspensión: Frasco x 100 ml

Venta Bajo Receta Simple Archivada
Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.
Elaborado por
Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S. A. – Acceso Norte
Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos - Asunción – Paraguay
Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719
SCAVONE HNOS. S.A.
Santa Ana N° 431 c/ Avda. España - Asunción – Paraguay
Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885
Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.

2437239/04