

**EMPAQUE
ALU-ALU**

VENOSAN® CALCIO DOBESILATO

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

SUPOSITORIOS
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: RECTAL

TRATAMIENTO DEL DEFICIT CIRCULATORIO VENOSO

FORMULA:

VENOSAN 500 : Cada comprimido recubierto contiene:

Calcio Dobesilato.....	500 mg
Excipientes.....	C.S.

VENOSAN SUPOSITORIOS: Cada supositorio contiene:

Calcio Dobesilato.....	250 mg
Dexametasona.....	0,25 mg
Lidocaína Clorhidrato.....	40 mg
Excipientes.....	C.S.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Aumenta la resistencia de la pared vascular y corrige la hiperpermeabilidad capilar. Disminuye la viscosidad sanguínea.

INDICACIONES:

Como adyuvante en el tratamiento de las tromboflebitis superficiales, síndromes post-trombóticos, úlcera varicosa, varices, varices del brazo, calambres nocturnos, retinopatía diabética, trastornos microcirculatorios de origen arterio-venoso, y síndromes hemorroidales. Microangiopatía diabética.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al principio activo. Primer trimestre del embarazo.

REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS COLATERALES:

Se han registrado casos aislados de trastornos gastrointestinales, náuseas, diarrea, erupción cutánea y fiebre. En casos de trastornos gastrointestinales, la dosis debería ser reducida o suspender temporariamente el tratamiento.

En los casos de reacción cutánea y fiebre, el tratamiento debe ser suspendido y el médico tratante informado. Con la administración de supositorios se han observado raros casos de cambios en el paso intestinal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

La administración oral de dobesilato de calcio es distribuido en la leche materna en pequeñas cantidades. La dosis debe reducirse en casos de insuficiencia renal severa que requiere diálisis. En casos muy raros (0,32/millón de pacientes), incidencia estimada sobre la base de reportes espontáneos, el dobesilato de calcio puede inducir la aparición de agranulocitosis, probablemente relacionada con una reacción por

hipersensibilidad. Esta condición puede expresarse por síntomas como fiebre alta, infecciones de la cavidad oral, u otros síntomas y/o signos de infección.

El paciente debe ser advertido que si presentara signos y/o síntomas de infección debe informar inmediatamente a su médico. En ese caso, es esencial el control, sin demora, del conteo de glóbulos blancos y la suspensión del tratamiento.

Comprimidos: Este medicamento contiene Lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia a la lactosa del APP insuficiencia observada en ciertas poblaciones de laponia o mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

POSOLOGÍA:

Comprimidos: Vía oral.

La dosis debe ser adaptada individualmente acorde a la severidad de cada caso. Se recomienda la administración de 1-2 comprimidos con el almuerzo. La posología y duración del tratamiento puede variar de algunas semanas a varios meses, dependiendo de la enfermedad y su evolución y del criterio médico. En la insuficiencia venosa crónica, un tratamiento de 3 semanas permite, en la mayoría de los casos, obtener una mejoría duradera.

Supositorios: Vía rectal.

Aplicar un supositorio a la mañana y otro a la noche (un supositorio cada 12 horas) o según indicación medica.

RESTRICCIONES DE USO: Embarazo – recién nacidos – lactancia

SOBREDOSIS (SIGNOS, SÍNTOMAS, CONDUCTA Y TRATAMIENTO): En caso de ingestión masiva accidental se realizará lavado gástrico y tratamiento sintomático habitual.

RECOMENDACIÓN:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204 800

PRESENTACIÓN:

- VENOSAN 500 : Caja x 28 comprimidos recubiertos.

Venta Bajo Receta

Conservar en sitio fresco y seco a temperatura inferior a 30° C.

Elaborado por Laboratorios Catedral - Scavone Hnos. S.A.

Planta Industrial Acceso Norte:

Calle Gral. Caballero esq. Cándido Vasconcellos - Asunción - Paraguay

Director Técnico: Dr. Ubaldo Scavone Y. - Reg. N° 793

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.

- VENOSAN SUPOSITORIOS: Caja x 5 supositorios.

Conservar en sitio fresco y seco a temperatura inferior a 20° C.

Venta Bajo Receta

Elaborado por Laboratorios Catedral - Scavone Hnos. S.A.

Planta Industrial: Av. España y San Martín - Asunción - Paraguay

Director Técnico: Dr. Ubaldo Scavone Y. - Reg. N° 793

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.



División Farmacéutica de SCAVONE HNOS S.A.

Santa Ana 431 c/ Av. España - Tel.: 608-171