



Fórmula:

Cada sobre de 5 g contiene:

Acido Ascórbico (Vitamina C).....1 g

Excipientes.....C.S

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antioxidante.

INDICACIONES:

VITASAN C está indicado en todos los estados donde hay una deficiencia o un aumento en los requerimientos de vitamina C en el cuerpo (encías sangrantes, cicatrización de heridas, cirugía, enfermedades infecciosas y otros).

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al ácido ascórbico o a alguno de los excipientes. Nefrolitiasis. Hiperoxaluria. Pacientes con insuficiencia renal grave o fallo renal. Hemocromatosis. Embarazo y lactancia. Diabetes mellitus, hemocromatosis, anemia sideroblástica, talasemia, anemia drepanocítica.

POSOLÓGIA Y MODO DE USO:

Vía oral. Sin alimentos.

Niños menores de 12 años: ingerir 1 sobre por día. Dosis máxima 1 g/día

Adultos: ingerir 1 o 2 sobres por día. Dosis máxima 2 g/día.

Modo de uso: Disolver el contenido del sobre en un vaso con agua (250 mL).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No administrar dosis más altas de lo indicado.

Dosis mayor a 2 g/día, produce formación de depósitos de oxalato de calcio, necrosis tubular aguda, y/o insuficiencia renal. También podría producir artritis gotosa en individuos susceptibles y formación de cálculos de ácido úrico.

Contiene: Colorante FDyC N°6 Amarillo (E-110) puede producir reacciones alérgicas. Puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

Embarazo y Lactancia: administrar con precaución, solo según prescripción médica cuando se considere esencial.

INTERACCIONES:

Anticoagulantes orales podrían verse modificada su acción.

Reduce las cantidades de Vitamina B12 en suero y reservas. Administrar VITASAN C al menos 2 hs después de las comidas.

Puede aumentar la absorción de hierro, precaución en pacientes con hemocromatosis hereditaria.

REACCIONES ADVERSAS:

Escorbuto al retirar la medicación bruscamente. Dolor en la zona renal (cálculos de oxalato en el tracto urinario), diarrea, cefalea, náuseas, vómitos y gastralgias.

SOBREDOSIS:

Síntomas: aumento de molestias gastrointestinales diarrea, náuseas, vómitos, calambres abdominales, cólicos.

Tratamiento: suspender la ingesta, tratamiento sintomático. Se elimina por hemodiálisis.



RECOMENDACIÓN:

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más Cercano, o al Centro Nacional de Toxicología, en Emergencias Médicas, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel. 204 800. Asunción – Paraguay

PRESENTACIÓN

Caja con 10 sobres x 5 g de polvo efervescente.

Caja con 50 sobres x 5 g de polvo efervescente.

Elaborado por Laboratorios Catedral

Scavone Hnos. S.A.

Planta Industrial Acceso Norte: Vía Férrea esq. Cándido Vasconellos

Asunción - Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. 2.719

Scavone Hnos. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España.

Asunción - Paraguay

Director Técnico: Q. F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Autorizado por el M.S.P. y B.S.

Certificado N° EF-000082-01

Mantener a temperatura ambiente.

(15 °C a 30 °C).

Conservar en lugar seco.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta Libre en Farmacias.

Industria Paraguaya.

Asunción – Paraguay.