

ANACTIVAN[®]

HALOPERIDOL



SOLUCIÓN / GOTAS - COMPRIMIDOS
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

SOLUCIÓN INYECTABLE
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: I.M.

FORMULA:

ANACTIVAN COMPRIMIDOS: Cada comprimido contiene:

Haloperidol.....5 mg
Excipientes.....c.s.

ANACTIVAN SOLUCIÓN INYECTABLE: Cada ampolla x 1 ml contiene:

Haloperidol.....5 mg
Excipientes.....c.s.

ANACTIVAN SOLUCIÓN GOTAS: Cada ml contiene **(1 ml = 26 gotas)**:

Haloperidol.....2 mg
Excipientes.....c.s.
(0,076 mg de Haloperidol por gota)

MECANISMO DE ACCIÓN E INDICACIONES:

El Haloperidol es un derivado de las butirofenonas, que es uno de los tranquilizantes mayores más interesantes por su amplitud de posibilidades terapéuticas en las variadas manifestaciones orgánicas y funcionales de los trastornos neuropsíquicos de la vida moderna.

Este fármaco cuyo amplio uso en todo el mundo avala su amplitud de la posibilidad de utilización, se ha demostrado particularmente eficaz en: trastornos de la conducta y del carácter de niños y adultos, tics, tartamudez, estados nauseosos, vómitos, hipo. Cuadros que se caracterizan por su intensa excitación psicomotriz: estados maniacos, demencia, oligofrenia, esquizofrenia aguda o crónica, paranoia.

Trastornos de la personalidad de los alcohólicos y otros cuadros de adicción o habituación a drogas. Trastornos seniles con tendencia a la fuga, agresividad. Movimientos involuntarios de tipo coreoatetósico. Estados de confusión mental.

Su administración oral consigue una absorción total de este medicamento y su detoxificación se hace por vía hepática y más lentamente por vía renal, tardando generalmente más de 24 horas para completarse, factor que tendrá en cuenta el facultativo para su correcta aplicación en los casos en que estos órganos se hallen afectados.

CONTRAINDICACIONES:

Trastornos neurológicos previos. Depresión del SNC, severa o tóxica (inducida por fármacos). Enfermedad de Parkinson. Se evaluará la relación riesgo - beneficio en alcoholismo activo, alergias, epilepsias, disfunción hepática o renal, hipertiroidismo o tirotoxicosis, glaucoma y retención urinaria.

EFFECTOS ADVERSOS:

Trastornos neurológicos de tipo extrapiramidal: temblores, hipertonía muscular, acatisia y en raros casos espasmo muscular esquelético; sedación intensa y somnolencia. Carece de efectos colaterales de área neurovegetativa.

Hipotensión ortostática en casos muy raros. Debe tenerse también presente que a pesar de su escaso o nulo efecto sobre la respiración puede verse una potencialización de hipnoanalégsicos y otros fármacos que producen depresión del SNC y es menester que el facultativo sea cauteloso en casos en que sea necesario el uso concomitante de estos fármacos.

En raros casos puede modificarse la liberación de gonadotropinas adenohipofisarias.

Toxicidad: Carece de efectos tóxicos hematopoyéticos, hepáticos, renales y otros trastornos, por lo que su uso prolongado



es totalmente inocuo.

INTERACCIONES:

Se potencia la acción del alcohol y puede producirse hipotensión severa.

Disminuye los efectos estimulantes de las anfetaminas y se reducen los efectos antipsicóticos del Haloperidol.

Puede aumentar ó disminuir la actividad anticoagulante de derivados cumarínicos ó de la Indantiona.

Intensifica los efectos antimuscarínicos de la atropina y compuestos relacionados.

Aumenta las concentraciones séricas de prolactina, al indicarse en forma simultánea con Bromocriptina.

Potencia la acción de depresores del SNC.

Disminuye los efectos hipotensores de la Guanetidina y los efectos de la Levodopa.

Puede producir efectos mentales no deseados (desorientación) con el uso simultáneo de la metildopa.

POSOLOGÍA:

Solución / Gotas - Comprimidos:

En niños se recomienda 0,1 mg x 3 kg/peso/día.

Menores de 5 años: 2 gotas cada 12 horas.

Mayores de 5 años: 5 gotas cada 12 horas.

La dosis de mantenimiento se mantendrá ó incrementará de manera gradual si el médico cree necesario.

Púberes y adultos: 0,5 a 2 mg cada 12 horas. En general las dosis de mantenimiento oscilan entre 5 y 15 mg por día.

Ancianos: 0,5 mg cada 12 horas inicialmente.

Mantenimiento 0,5 a 2 mg cada 12 horas.

Inyectable:

En adultos y adolescentes: 2 a 5 mg por vía I.M.

La dosis puede ser repetida si es necesario a intervalos de 1 hora ó cada 4 a 8 horas si los síntomas se controlan.

RECOMENDACIÓN:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas

Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204800

PRESENTACIÓN:

ANACTIVAN: Caja x 50 comprimidos

ANACTIVAN SOLUCIÓN INYECTABLE: Caja x 5 y 100 ampollas x 1 ml

ANACTIVAN SOLUCIÓN / GOTAS: Frasco gotero x 10 ml

VENTA BAJO RECETA SIMPLE ARCHIVADA

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Elaborado por

Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S. A. – Acceso Norte

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos - Asunción – Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719

SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España - Asunción – Paraguay

Director Técnico: Q.F. Amílcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.