



Fórmula:

Cada sobre de 5 g contiene:

Acido Ascórbico (Vitamina C).....2 g  
Excipientes.....C.S.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA:** Antioxidante.

**INDICACIONES:**

VITASAN C está indicado en todos los estados donde hay una deficiencia o un aumento en los requerimientos de vitamina C en el cuerpo (encías sangrantes, cicatrización de heridas, cirugía, enfermedades infecciosas y otros).

**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad al ácido ascórbico o a alguno de los excipientes. Nefrolitiasis. Hiperoxaluria. Pacientes con insuficiencia renal grave o fallo renal. Hemocromatosis. Embarazo y lactancia. Diabetes mellitus, hemocromatosis, anemia sideroblástica, talasemia, anemia drepanocítica. Población pediátrica.

**POSOLOGÍA Y MODO DE USO:**

Vía oral. Sin alimentos.

Adultos: ingerir 1 sobre por día. Dosis máxima 2 g/día.

Modo de uso: Disolver el contenido del sobre en un vaso con agua (250 mL).

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

No administrar dosis más altas de lo indicado.

Dosis mayor a 2 g/día, produce formación de depósitos de oxalato de calcio, necrosis tubular aguda, y/o insuficiencia renal. También podría producir artritis gotosa en individuos susceptibles y formación de cálculos de ácido úrico.

Contiene: Colorante FDyC N°6 Amarillo (E-110) puede producir reacciones alérgicas. Puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

Embarazo y Lactancia: administrar con precaución, SOLO según prescripción médica cuando se considere esencial.

**INTERACCIONES:**

Anticoagulantes orales: podrían verse modificada su acción.

Reduce las cantidades de Vitamina B12 en suero y reservas. Administrar VITASAN C al menos 2 hs después de las comidas.

Puede aumentar la absorción de hierro, precaución en pacientes con hemocromatosis hereditaria.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Escorbuto al retirar la medicación bruscamente. Dolor en la zona renal (cálculos de oxalato en el tracto urinario), diarrea, cefalea, náuseas, vómitos y gastralgias.

**SOBREDOSIS:**

Síntomas: aumento de molestias gastrointestinales diarrea, náuseas, vómitos, calambres abdominales, cólicos.

Tratamiento: suspender la ingesta, tratamiento sintomático. Se elimina por hemodiálisis.

**RECOMENDACIÓN:**

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más Cercano, o al Centro Nacional de Toxicología, en Emergencias Médicas, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel. 204 800. Asunción – Paraguay.

**PRESENTACIÓN**

Caja con 10 sobres x 5 g de polvo efervescente.

Caja con 50 sobres x 5 g de polvo efervescente.

.Elaborado por Laboratorios Catedral  
Scavone Hnos. S.A.  
Planta Industrial Acceso Norte: Vía Férrea esq. Cándido Vasconellos  
Asunción - Paraguay  
Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. 2.719  
Scavone Hnos. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España.  
Asunción - Paraguay  
Director Técnico: Q. F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Autorizado por el M.S.P. y B.S.  
Certificado N° EF-000082-01

Mantener a temperatura ambiente.  
(15 °C a 30 °C).  
Conservar en lugar seco.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta Libre en Farmacias.  
Industria Paraguaya.  
Asunción – Paraguay.