

PROTIL®

OLANZAPINA 10 mg



ANTIPSICOTICO

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

FORMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Olanzapina..... 10 mg

Excipientes..... C.S.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antipsicótico atípico, con baja incidencia de efectos extrapiramidales y buena eficacia contra los síntomas negativos.

Posee acción bloqueante a nivel de los receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos, muscarínicos, histaminérgicos y alfa-1-adrenérgicos.

INDICACIONES:

Trastornos psicóticos agudos y crónicos, en particular en la esquizofrenia, donde presenta acción terapéutica tanto sobre los síntomas positivos como negativos.

CONTRAINDICACIONES:

Sensibilidad al principio activo. Es potencialmente riesgoso durante el embarazo.

PRECAUCIONES:

Lactancia: probablemente segura a dosis habituales. Podría aumentar los niveles de prolactina materna.

Niños: epilepsia o predisposición a convulsiones. Enfermedad cerebro-vascular. Trastornos cardiovasculares (insuficiencia cardíaca, trastornos de la conducción, tendencia a la hipotensión arterial). Glaucoma de ángulo estrecho, prostatismo, íleo paralítico, enfermedad hepática, historia de cáncer de mama.

Es recomendable el control de las transaminasas séricas en los pacientes con hepatopatías.

No manejar vehículos ni máquinas peligrosas.

Evitar la ingesta de alcohol y otras drogas neurodepresoras.

REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS COLATERALES:

Las propias del bloqueo dopaminérgico (disonías agudas, parkinsonismo, acatisia, disquinesia tardía) aunque con una frecuencia considerablemente menor que los antipsicóticos típicos (neurolépticos).

Aumento del apetito y del peso corporal.

Por bloqueo histaminérgico: sedación, astenia, somnolencia.

Por bloqueo adrenérgico: hipotensión arterial postural.

Por bloqueo colinérgico: sequedad bucal, constipación, visión borrosa, dificultad miccional.

Aumento de las transaminasas y de la gamma-GT, sin síntomas de disfunción hepática.

Hiperprolactinemia.

INTERACCIONES:

Su uso simultáneo con alcohol, anticolinérgicos y depresores del SNC, suman sus efectos.

Puede aumentar el efecto de algunos antihipertensivos.

Antagoniza el efecto de agonistas dopaminérgicos y levodopa.

El tabaco y la carbamazepina aumentan su depuración en un 40 - 50 %

POSOLOGÍA:

Vía oral.

De 5 a 10 mg diarios, en una sola toma. Puede aumentarse hasta 20 mg diarios en dos tomas.

RECOMENDACIÓN:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas - Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204 800

PRESENTACIÓN:

Caja x 30 comprimidos recubiertos.

Caja x 50 comprimidos recubiertos.

VENTA BAJO RECETA SIMPLE ARCHIVADA

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Elaborado por

Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S. A. – Acceso Norte

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos - Asunción – Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719

SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España - Asunción – Paraguay

Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños