



# Multivitan<sup>®</sup> PLUS

COMPLEMENTO VITAMINICO + OLIGOELEMENTOS

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS  
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

## FORMULA:

Vitamina A.....	10.000 U.I.
Vitamina D.....	200 U.I.
Vitamina B1.....	100 mg
Vitamina B2.....	10 mg
Vitamina B6.....	100 mg
Vitamina B12.....	0,50 mg
Vitamina E.....	30 mg
Biotina.....	0,025 mg
Nicotinamida.....	0,5 mg
Calcio Pantotenato.....	25 mg
Dicalcio Fosfato.....	55 mg
Ferroso Sulfato.....	25 mg
Magnesio Sulfato.....	30 mg
Cobre Sulfato.....	1,2 mg
Zinc Sulfato.....	0,8 mg
Manganeso Sulfato.....	1 mg
Potasio Ioduro.....	0,15 mg
Sodio Fluoruro.....	0,2 mg
Excipientes.....	c.s.

## INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Estados carenciales debido a déficit nutricional, edad ,y/o estrés.

Actividad física intensa.

Estados de convalecencia prolongada.

Trastornos nutricionales por intolerancias o trastornos digestivos.

Reconstituyente físico en estados de fatiga excesiva.

## CONTRAINDICACIONES:

Alergia conocida a cualquiera de los componentes. Hemocromatosis/hemosiderosis. Enfermedad gastrointestinal inflamatoria activa. Alcoholismo activo. Sarcoidosis. Hiperparatiroidismo.

## REACCIONES ADVERSAS:

Debido a la presencia de hierro, las heces pueden adquirir un color verde oscuro o negro, inofensivo, que se normaliza al suspender la ingesta del medicamento.

Puede causar malestar gastrointestinal, náuseas, estreñimiento.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Este medicamento contiene Almidón, por lo que debe tenerse en cuenta en el tratamiento de los pacientes celíacos. Los pacientes con alergia al almidón no deben tomar este medicamento.

Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia a la lactasa de LAAP insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia o mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

Embarazo: Debido a la presencia de vitamina A, el Multivitan 27 Plus no debe ser ingerido durante el primer trimestre del embarazo. Su uso durante el segundo y tercer trimestre debe ser valorado en relación con el

riesgo /beneficio y la prevalencia de déficit de vitamina A.

Lactancia: La dosis de vitamina A utilizada en Multivitan 27 Plus es superior a la recomendada para madres lactantes (1500 mcg), por lo que el medicamento debe evitarse durante este periodo.

Fertilidad: El déficit de ciertos micronutrientes (complejo de vitaminas B, Vitamina D, ac. Fólico, antioxidantes) ha sido ligado en algunas publicaciones a dificultad para embarazarse. La suplementación con micronutrientes disminuyó el riesgo de infertilidad por anovulación y aumento el embarazo exitoso en algunos estudios observacionales. A pesar de no contar estudios específicos para Multivitan 27 Plus, con la información disponible en relación con sus componentes, no hay razón para creer que pudiera afectar la fertilidad negativamente.

#### **POSOLOGÍA Y MODO DE USO:**

Un comprimido recubierto vía oral, pudiendo aumentar según criterio del médico.

#### **INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS:**

El consumo simultaneo con antiácidos, café, medicamentos con bicarbonatos, fosfatos y oxalatos pueden disminuir la absorción de hierro.

El consumo simultaneo con leche o productos lácteos puede disminuir la absorción de calcio.

La cimetidina y la ciprofloxacina ambos pueden disminuir la absorción de hierro.

El Multivitan 27 Plus puede disminuir la absorción de tetraciclinas orales.

Para evitar interacciones, se recomienda ingerir el medicamento una hora antes o dos horas después de las comidas o los productos antes mencionados.

#### **SOBREDOSIS (SIGNOS, SÍNTOMAS, CONDUCTA Y TRATAMIENTO):**

La ingesta excesiva de Multivitan 27 Plus puede tener efectos secundarios graves, manifestados por: náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, constipación, alteración de la presión arterial (hipertensión), cefaleas intensas, lesiones cutáneas, hepatotoxicidad, hipercalcemia, hemorragias y aumento de la presión arterial.

#### **RECOMENDACIÓN:**

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas - Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204800

#### **PRESENTACIÓN:**

Caja x 30 y 50 comprimidos recubiertos.

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco

Venta Libre en Farmacias

Elaborado por

Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S. A. – Acceso Norte

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconellos - Asunción – Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719

SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España - Asunción – Paraguay

Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.