

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porciones por envase: 30
Porción: 0,5 g (1 cápsula)

Cantidad por porción	0,5 g	%VD(*)
Ácido Hialurónico (mg)	65	**

No contiene cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, azúcares totales, azúcares añadidos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibras alimenticias y sodio.

*% Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. **Valores diarios no establecidos.

Ingredientes: hialuronato de sodio obtenido por fermentación de *Streptococcus zooepidemicus*, excipientes: celulosa microcristalina, estearato de magnesio, dióxido de silicio, gelificante gelatina, colorantes azorrubina, azul brillante y dióxido de titanio.

ALÉRGENOS: PUEDE CONTENER PESCADOS Y SOYA. NO CONTIENE GLUTEN.

Elaborado por:
Laboratório Tiaraju Alimentos e Cosméticos S.A.
Av. Sagrada Família, 2924
Santo Angelo - RS
CEP 98.805-678
CNPJ: 08.352.440/0001-10
INDÚSTRIA BRASILEIRA
D.T.: Antonio Carlos Luca Rigon CRF RS 3037.



Importado por:
SCAVONE HNOS. S.A.,
Santa Ana Nº 431 c/Avda. España.
Tel: 021 608 171
D.T.: Q.F. Amílcar Sena
Reg. Prof. Nº 4885



Autorizado por DINAVISA:



Lote y Vencimiento: ver en fondo del frasco.

TIARAJU

ÁCIDO HIALURÓNICO

SUPLEMENTO DIETARIO EN CÁPSULAS

✓ Para la protección de la piel contra la deshidratación.¹

65 mg
de Ácido
Hialurónico
por porción

Contiene **30**
cápsulas
Coloreado artificialmente

Vía de Administración: Oral

VENTA LIBRE

Posología: Adultos a partir de 19 años, consumir 1 cápsula al día, con 200 mL (1 vaso) de agua.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. NO EXCEDER LA RECOMENDACIÓN DIARIA DE CONSUMO INDICADO EN EL ENVASE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

¹ **Usos y Aplicaciones:** Protección de la piel contra la deshidratación.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo. Embarazo y lactancia.

Reacciones Adversas: Se han notificado muy pocos efectos secundarios del Ácido Hialurónico. Es aconsejable tener precaución en caso de embarazo y lactancia.

Sobredosis: No se reportan. En caso de emergencia, recurrir al Hospital más cercano o al Centro de Toxicología en Emergencias Médicas, sito en Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos. Tel: 204-800. Asunción, Paraguay.

Conservar el producto a temperatura ambiente (15 - 30 °C), protegido de la luz y la humedad. Una vez abierto, conservar el producto en su envase original y bien cerrado.

