

CEPROX[®]

CEFTRIAJONA

ANTIBIOTICO

POLVO

VIA DE ADMINISTRACION: I.M. - I.V.

FORMULA:

Cada frasco ampolla con polvo contiene:

Ceftriaxona Sódica eq. a Ceftriaxona Base.....1 g

Cada ampolla solvente x 10 ml de CEPROX I.V. contiene:

Agua Destilada Apirógena.....10 ml

Cada ampolla solvente x 3,5 ml de CEPROX I.M. contiene:

Lidocaína Clorhidrato.....1 %

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

CEPROX es un antibiótico cefalosporínico de tercera generación, de administración parenteral.

Presenta un grado elevado de estabilidad frente a las beta lactamasas, teniendo una excelente actividad frente a un espectro más amplio de bacterias Gram negativas (la mayoría de las enterobacterias) y Gram positivas.

INDICACIONES:

Infecciones del tracto biliar producidas por *Escherichia coli*, especies de *Klebsiellas*, *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus* Infecciones del tracto genitourinario producidas por especies de *Clostridium*, *S. epidermidis*. Gonorrea. Neumonía. Septicemia bacteriana. Infecciones de la piel y tejidos blandos.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a las cefalosporinas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Debe ser administrada con cuidado en presencia de insuficiencia renal. El diluyente con lidocaína al 1% es de uso exclusivo por vía IM. No se aconseja inyectar más de 1 g en cada sitio. Embarazo y lactancia. Incompatible en la misma solución con vancomicina.

REACCIONES ADVERSAS:

Rara incidencia. Calambres, dolor y distensión abdominal.
Diarrea acuosa, aumento de sed, náuseas, vómitos.

INTERACCIONES:

El probenecid disminuye la secreción tubular renal, lo que da como resultado un aumento y prolongación de las concentraciones sericas de ceftriaxona. Con cidosporina puede aumentar su toxicidad.

POSOLÓGIA:

Adultos: 1 a 2 g cada 24 horas I.M. ó I.V.

Profilaxis preoperatoria: 1 g I.M. ó I.V., 30 minutos a 2 horas antes de la cirugía.

Pediatría: 25 mg a 37,5 mg/kg I.M. ó I.V. cada 12 horas.

Meningitis: 50 mg/kg, I.M. ó I.V. cada 12 horas (puede iniciarse con una dosis de carga de 75 mg/kg)

En pacientes con disfunción hepática ó renal no debe superar 2 g/día. Las soluciones reconstituídas conservan su estabilidad fisicoquímica durante 6 horas a temperatura ambiente ó durante 24 horas a 5 °C.

RECOMENDACIÓN:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Medicas Av. Gral Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204 800

PRESENTACIÓN:

CEPROX I.V. Frasco ampolla + solvente x 10 ml

CEPROX I.M. Frasco ampolla + solvente x 3,5 ml

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Luego de preparada la solución: durante 6 horas a T° inferior a 30 °C ó 24 horas a 5 °C.

Venta Bajo Receta Simple Archivada

Elaborado por Laboratorios Richet S.A. - Terrero 1259 - Buenos Aires - Argentina

Director Técnico: Lic. Enrique Altmark

PARA: SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España - Asunción - Paraguay

Director Técnico: Q.F. Amílcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.