

CLIDIAN®

CLOTRIMAZOL

ÓVULOS

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: VAGINAL

VAGINITIS - VULVOVAGINITIS - VULVITIS CANDIDIASICAS

FORMULA:

Cada Ovulo contiene:

Clotrimazol..... 100 mg
Excipientes..... C.S.

INDICACIONES:

Indicado para vaginitis, vulvovaginitis, vulvitis candidiasicas.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al clotrimazol o a otros antimicóticos irridazolicos.

MECANISMO DE ACCIÓN:

El clotrimazol su mecanismo de acción lo ejerce sobre la membrana celular de los hongos de manera a aumentar la permeabilidad, lo que lleva a la perdida de los elementos celulares, indispensables para el crecimiento y la vida celular.

La absorción es buena por la mucosa vaginal. La porción absorbida sufre una biotransformacion en el organismo, se excreta por la orina y por las heces.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Estudios clínicos no han dado ningún indicio que con la aplicación del clotrimazol durante el embarazo pueden observarse efectos dañinos para la madre o el feto. Sin embargo durante el primer trimestre de embarazo como todos los medicamentos el uso del clotrimazol queda bajo responsabilidad del médico tratante.

REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS COLATERALES:

En raros casos podrá presentarse desarrollo de irritación y/o sensibilización, por lo que en estos casos se deberá suspender el tratamiento y aplicar las medidas correctivas necesarias.



INTERACCIONES:

Esta contraindicado su uso con anticoagulantes, pues el clotrimazol potencia el efecto de los mismos. El clotrimazol en raras ocasiones puede reducir la efectividad y seguridad de los productos de látex (por ejemplo condones y diafragma) al igual que espermicidas vaginales, sin embargo este efecto es temporal y se presenta solo durante el tratamiento.

POSOLOGIA:

Un óvulo vaginal a la noche durante 8 o 10 días. Si hay una micosis comprobada, 3 semanas de tratamiento previenen el riesgo de recaídas.

Para garantizar la eficacia del tratamiento se recomienda:

- a) Efectuar el tratamiento durante los días sin menstruación
- b) Efectuar el tratamiento sin intercurso de vida sexual activa.

RECOMENDACIONES:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas - Av. Gral Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204 800

PRESENTACION:

CLIDIAN: Caja conteniendo 10 óvulos.

Conservar en la heladera entre 2º a 8º C.

Venta Bajo Receta.

Elaborado por Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. - Acceso Norte.

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos.

Asunción - Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719

Para: PHARMETICA

División Farmacéutica de Scavone Hnos. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España.

Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.