

ESPASMOSAN[®]

PROPINOXATO
CLONIXINATO DE LISINA

COMPUESTO FORTE

ANTIESPASMODICO - ANALGESICO
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
VIA DE ADMINISTRACION: ORAL

FORMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Propinoxato Clorhidrato.....	20 mg
Clonixinato de Lisina.....	125 mg
Excipientes.....	c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Indicado en estados espasmódicos del tracto gastrointestinal, biliar o urogenital en los cuales predomina el componente doloroso.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida a los principios activos, glaucoma, miastenia gravis, retención urinaria, hipertrofia prostática, estenosis pilórica orgánica. Embarazo y lactancia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, prostatismo, retardo de la evacuación gástrica orgánica o funcional, reflujo gastroesofágico. En pacientes añosos o debilitados pueden ocasionar trastornos del SNC, atonía intestinal o retención urinaria. Embarazo. Pacientes con antecedentes de ataques asmáticos consecutivos a la ingestión de otros AINE.

REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS COLATERALES:

Sequedad de boca, disuria, visión borrosa, constipación, taquicardia modificables mediante un ajuste posológico, náuseas, vómitos.

INTERACCIONES:

Los antihistamínicos, fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos, quinidina, y procainamida potencian los efectos tóxicos de los anticolinérgicos. El empleo concomitante con analgésicos opioides puede inducir un incremento del riesgo de constipación severa. Aumenta la acción del litio y metotrexato. Aumenta el riesgo de sangrados con anticoagulantes y trombolíticos. Disminuye la acción de antihipertensivos.

POSOLOGÍA:

Vía oral: Un comprimido recubierto 3 a 5 veces al día.

SOBREDOSIS (SIGNOS, SÍNTOMAS, CONDUCTA Y TRATAMIENTO):

Hasta el momento no se conocen las manifestaciones clínicas de la sobredosis de propinoxato y el clonixinato de lisina. En caso de ocurrir sobredosis los síntomas serán gástricos y somnolencia. El tratamiento a seguir incluye lavado gástrico, administración de carbón activado, control clínico del paciente y tratamiento de los posibles síntomas anticolinérgicos.

RECOMENDACIÓN:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas

Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204800

PRESENTACIÓN:

Caja x 10 comprimidos recubiertos

Venta Bajo Receta

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Elaborado por:

Laboratorios Catedral de Scavone Hnos S.A. – Acceso Norte.

Planta industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos.

Asunción - Paraguay.

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719

SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España

Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.