

NOCAND[®]

**MICONAZOL - LIDOCAINA
FLUCINOLONA - GENTAMICINA
TINIDAZOL**

PLUS

**ANTIMICROBIANO POLIVALENTE
ANTIINFLAMATORIO**

**OVULOS
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: VAGINAL**

FORMULA:

Cada óvulo contiene:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Miconazol Nitrato (micronizado)..... | 200 mg |
| Tinidazol..... | 150 mg |
| Lidocaína Clorhidrato..... | 57,777 mg |
| Gentamicina Sulfato 590UG/mg..... | 2,5 mg |
| Fluocinolona Acetonida..... | 0,250 mg |

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

NOCAND PLUS, es un antimicrobiano de amplio espectro con acción antiinflamatoria y antipruriginosa, destacándose su actividad sobre los gérmenes que con mayor frecuencia son los causantes del flujo vaginal patológico (leucorrea) y sus síntomas acompañantes.

INDICACIONES:

Vulvovaginitis por *Trichomonas vaginalis*, *Cándida albicans* (moniliasis), *Gardnerella vaginalis*, anaerobios y otras bacterias de menor frecuencia.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de los principios activos., a los anestésicos locales de tipo amida o relacionados, a antibióticos aminoglucósidos. Contraindicado en aquellos pacientes que han mostrado hipersensibilidad al Miconazol

REACCIONES ADVERSAS:

Irritación local, prurito. Raramente, en personas sensibles, pueden aparecer escozor, edema o reacción alérgica en la zona de aplicación.

Proliferación de organismos no sensibles, incremento de alguna infección incipiente. Como



sucede con todos los medicamentos, cualquier paciente puede desarrollar reacciones de idiosincrasia a los componentes de la fórmula; además, los efectos secundarios son reversibles y desaparecen al suspender el tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

En caso de desarrollarse irritación o sensibilización, se debe discontinuar el tratamiento e instaurarse medidas adecuadas.

Embarazo y Lactancia

No es de esperarse una absorción significativa, por lo que, su empleo durante el Embarazo y Lactancia queda bajo estricto juicio del médico; pero debido a que contiene un corticoide en su fórmula, pueden producirse en algunos casos de rebote, por lo que deberá usarse exclusivamente en sus Indicaciones terapéuticas precisas.

EFECTOS SECUNDARIOS:

Fuera de los efectos de carácter local, generalmente irritativos no son de esperar otro tipo de efectos colaterales.

INTERACCIONES:

Fenitoína: El uso simultáneo puede producir un aumento de la concentración sérica de la fenitoína, con riesgo de toxicidad. Warfarina: El uso simultáneo puede aumentar el efecto anticoagulante, con riesgo de hemorragias.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Introducir un óvulo profundamente en la vagina, por la noche al acostarse, durante 10 días.

RESTRICCIONES DE USO:

Embarazo en el primer trimestre. Lactancia.

SOBREDOSIS:

No se han reportado casos de sobredosis o ingesta accidental; sin embargo, en caso de ingesta masiva se procederá a realizar lavado gástrico y manejo sintomático.

RECOMENDACIÓN:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas -Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204800

PRESENTACIÓN:

Caja x 10 óvulos de gelatina.

Venta Bajo Receta.

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Elaborado por SWISS PHARMA GROUP S.A.

Zapadores del Chaco y Lope de Vega - San Lorenzo, Paraguay

Director Técnico: Q.F. Myriam Cabriza de Paredes - Reg. N° 2837

Acondicionado por Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S. A. – Acceso Norte

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos - Asunción – Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.