

# PEREBRON®

## OXOLAMINA

ANTIINFLAMATORIO ESPECIFICO  
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS  
ANTITUSIGENO

SOLUCIÓN ORAL  
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

### FORMULA:

PEREBRON ADULTOS: Cada 5 ml contiene:

Oxolamina Fosfato.....70 mg  
Excipientes.....C.S.

PEREBRON INFANTIL: Cada 5 ml contiene:

Oxolamina Citrato.....50 mg  
Excipientes.....C.S.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA:

PEREBRON ejerce una acción antiinflamatoria sobre la mucosa del tracto respiratorio, disminuyendo la congestión y el edema y en consecuencia la exudación.

Por este mecanismo disminuye eficazmente los fenómenos irritativos desencadenantes de la tos, que asociado a la acción suave sobre el centro bulbar de la tos, determina su acción antitusígena.

### INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

En todos los procesos que se acompañan de tos, especialmente los que cursan con inflamación del árbol bronquial, tales como laringitis, reacciones lárgeas post-operatorias, traqueobronquitis, bronconeumonía, neumopatías febriles, asma, tos por aspiración de sustancias irritativas y en general en procesos inflamatorios agudos y crónicos de las vías respiratorias. Bronquitis. Asma bronquial. Tos de los fumadores.

### CONTRAINDICACIONES:

No administrar en pacientes que hayan mostrado reacciones de hipersensibilidad a uno de sus componentes.

### **REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS COLATERALES:**

Sensación de plenitud gástrica. Epigastralgias, acidez, náuseas y vómitos. Pérdida de apetito. Mareos. Sedación.

En ocasiones, náuseas y/o diarreas. No deprime el centro respiratorio. No crea hábito. No causa estreñimiento.

### **PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS:**

El paciente con terapia anticoagulante (cumarínicos), no debe consumir Oxolamina sin consultar primero con su médico tratante, porque puede prolongar el tiempo de protrombina.

### **RESTRICCIONES DE USO:**

Hipersensibilidad a la droga. Pacientes con tratamiento anticoagulante.

### **INTERACCIONES:**

Se ha observado un aumento del tiempo de protrombina en algunos pacientes tratados con anticoagulantes cumarínicos, no así con el Acido Acetil Salicílico.

### **POSOLÓGIA:**

Vía oral.

PEREBRON ADULTOS SOLUCIÓN ORAL: Adultos: 2 cucharaditas (10 ml) cada 4 horas.

PEREBRON INFANTIL SOLUCIÓN ORAL: Niños de 3 meses a 2 años: 1 cucharadita (5 ml) cada 4 horas.

-Niños de 2 a 10 años: 2 cucharaditas (10 ml) cada 4 horas.

-Niños mayores de 10 años: 2 a 3 cucharaditas cada 4 horas.

### **RECOMENDACIÓN:**

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas -Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204 800

### **PRESENTACIÓN:**

PEREBRON ADULTOS: Frasco x 120 ml

PEREBRON INFANTIL: Frasco x 120 ml

Venta Bajo Receta

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Elaborado por

Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. - Acceso Norte.

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconellos.

Asunción - Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719

SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/Avda. España.

Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

bajo licencia de A.C.R. Angelini Francesco A.C.R.A.F. - S.p.A. - Roma - Italia

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños