

## INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porciones por envase: 60

Porción: 0,25 g (1 comprimido)

Cantidad por porción	0,25 g	%VD(*)
Vitamina B12 (µg)	9,94	414

No contiene cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, azúcares totales, azúcares añadidos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibras alimenticias y sodio.

% Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas. \*\*Valores diarios no establecidos.

**Ingredientes:** cianocobalamina; excipientes: elulosa microcristalina, estearato de magnesio, ióxido de silicio, croscaramelosa sódica.

**ALÉRGENOS: PUEDE CONTENER ESCADOS Y SOYA. NO CONTIENE GLUTEN.**

Elaborado por:

Laboratório Tiaraju Alimentos e Cosméticos S.A.  
Av. Sagrada Família, 2924  
Santa Ângelo - RS  
CEP 98.805-678  
CNPJ: 08.352.440/0001-10  
**INDÚSTRIA BRASILEIRA**



Importado por:

SCAVONE HNOS. S.A.  
Santa Ana Nº 431 c/Avda. España.  
Tel.: 021 608 171  
D.T.: Q.F. Amílcar Sena  
Reg. Prof. Nº 4885

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR  
0800 11 0074



Autorizado por DINAUSA:



Lote y Vencimiento: ver en fondo del frasco.

**TIARAJU**

# VITAMINA B12

## SUPLEMENTO DIETARIO EN COMPRIMIDOS

✓ Alto contenido en vitamina B12.

**9,94 µg de  
Vitamina B12  
por porción**

**Contiene 60  
comprimidos**

Vía de Administración: Oral

**VENTA LIBRE**

**Posología:** adultos a partir de 19 años, consumir 1 comprimido al día, con 200 mL (1 vaso) de agua.

**ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. NO EXCEDER LA RECOMENDACIÓN DIARIA DE CONSUMO INDICADO EN EL ENVASE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**Usos y Aplicaciones:** Ayuda al mantenimiento del estado hematológico, estimula la producción de energía y contribuye al mantenimiento de un sistema nervioso saludable.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo.

**Reacciones Adversas:** Dolor de cabeza, náuseas y vómitos, diarrea, fatiga.

**Sobredosis:** No se reportan. En caso de emergencia, recurrir al Hospital más cercano o al Centro de Toxicología en Emergencias Médicas, sito en Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos. Tel.: 204-800. Asunción, Paraguay.

Conservar el producto a temperatura ambiente (15 - 30 °C), protegido de la luz y la humedad. Una vez abierto, conservar el producto en su envase original y bien cerrado.